

Minory a stupně v grafu

Zdeněk Dvořák

16. listopadu 2015

1 Minory a podrozdělení

Definice 1. Graf H je minor grafu G , lze-li H získat z podgrafu G kontrakcemi hran.

Definice 2. Model grafu H v grafu G je funkce φ přiřazující vrcholům grafu H navzájem vrcholově disjunkttní souvislé podgrafy grafu G tak, že pro každé $uv \in E(H)$ existuje v G hrana s jedním koncem ve $\varphi(u)$ a druhým koncem ve $\varphi(v)$.

Pozorování 1. Graf H je minorem grafu G právě tehdy, když existuje model H v G .

Pozorování 2. Obsahuje-li G podrozdělení grafu H jako podgraf, pak H je minor G . Je-li H minorem G a maximální stupeň H je nejvýše 3, pak G obsahuje podrozdělení H jako podgraf.

2 Klikové součty

Definice 3. Nechť G je graf takový, že $G = G_1 \cup G_2$. Nechť $S = V(G_1 \cap G_2)$ a G'_1 a G'_2 jsou grafy vzniklé z G_1 a G_2 přidáním všech hran s oběma konci v S . Je-li $k = |S|$, říkáme, že G je k -suma grafů G'_1 a G'_2 .

Lemma 3. Nechť H je 3-souvislý graf. Pak H není minorem grafu G právě tehdy, když existují 3-souvislé grafy neobsahující H jako minor, z nichž se G dá vyrobit pomocí (≤ 2) -sum.

Důkaz. Dokážeme indukcí dle počtu vrcholů G , že pokud H není minorem grafu G , pak existují 3-souvislé grafy G_1, \dots, G_m neobsahující H jako minor, z nichž se G dá vyrobit pomocí (≤ 2) -sum. Je-li G 3-souvislý, pak je tvrzení triviální. Nechť S je nejmenší řez v G a předpokládejme, že $|S| \leq 2$. Nechť

$G = G_1 \cup G_2$ pro podgrafy G_1 a G_2 tž. $V(G_1) \neq S \neq V(G_2)$ a $S = V(G_1 \cap G_2)$. Necht' G'_1 a G'_2 jsou grafy vzniklé z G_1 a G_2 přidáním hrany s oběma konci v S když $|S| = 2$, a necht' $G'_1 = G_1$ a $G'_2 = G_2$ jestliže $|S| \leq 1$. Pak G je $|S|$ -suma G'_1 a G'_2 . Stačí tedy ukázat, že G'_1 ani G'_2 neobsahují H jako minor, a tvrzení pak bude plynout z indukčního předpokladu aplikovaného na G'_1 a G'_2 .

Jestliže $G'_1 = G_1$, pak G'_1 je podgraf G , a tedy zjevně neobsahuje H jako minor. Proto můžeme předpokládat, že $|S| = 2$ a $G'_1 = G_1 + xy$, kde $S = \{x, y\}$. Z minimality S plyne, že G je 2-souvislý, a proto G_2 obsahuje cestu P mezi x a y . Proto G'_1 je minorem grafu $G_1 + P \subseteq G$. Tedy G'_1 je minor G , a proto G'_1 neobsahuje H jako minor. Obdobně ani G'_2 neobsahuje H jako minor.

Nyní ukažme opačnou implikaci. Zjevně stačí ukázat, že neobsahují-li grafy G'_1 a G'_2 graf H jako minor, pak ani (≤ 2) -suma G grafů G_1 a G_2 neobsahuje H jako minor. Necht' $S = V(G'_1 \cap G'_2)$. Kdyby G obsahovalo H jako minor, pak uvažme model φ grafu H v G . Kdyby existovaly vrcholy $u, v \in V(H)$ takové, že $\varphi(u) \subseteq V(G'_1) \setminus S$ a $\varphi(v) \subseteq V(G'_2) \setminus S$, pak H by obsahovalo řez velikosti nejvýše $|S| \leq 2$ (který φ zobrazuje na podgrafy obsahující vrcholy S), což je ve sporu s předpokladem, že H je 3-souvislý. Proto ze symetrie můžeme předpokládat, že pro každé $v \in V(H)$ má $\varphi(v)$ neprázdný průnik s G'_1 . Pak ale restrikce modelu φ na vrcholy G'_1 dává model H v G'_1 , což je spor, jelikož G'_1 neobsahuje H jako minor. \square

3 Zakázané kliky

Lemma 4.

- Graf G neobsahuje K_2 jako minor právě tehdy, když G nemá žádné hrany, tj. G je 0-suma kopií K_1 .
- Graf G neobsahuje K_3 jako minor právě tehdy, když G je les, tj. G je (≤ 1) -suma kopií K_1 a K_2 .
- Graf G neobsahuje K_4 jako minor právě tehdy, když G je (≤ 2) -suma kopií K_1 , K_2 a K_3 .

Důkaz. První dvě tvrzení jsou triviální. Uvažme 3-souvislý graf F s alespoň čtyřmi vrcholy, a necht' C je nejkratší cyklus v F (zjevně F není les). Cyklus C je indukovaný, jelikož je nejkratší v F . Jelikož F je 3-souvislý a $|V(F)| \geq 4$, existuje $v \in V(F) \setminus V(C)$. Dle Mengerovy věty existují tři vrcholově disjunktní cesty z v do $V(C)$, které dohromady tvoří podrozdělení K_4 .

Každý 3-souvislý graf s alespoň čtyřmi vrcholy tedy obsahuje K_4 jako minor. Třetí tvrzení pak plyne z Lemma 3, jelikož jediné 3-souvislé grafy s nejvýše třemi vrcholy jsou K_1 , K_2 a K_3 . \square

Nechť W_8 je graf na 8 vrcholech v_1, \dots, v_8 a s hranami $v_i v_{i+1}$ a $v_i v_{i+4}$ pro $1 \leq i \leq 8$ (kde indexy se berou cyklicky, tj. $v_9 = v_1$, $v_{10} = v_2$, \dots).

Věta 5 (Wagner, nebudeme dokazovat). *Graf G neobsahuje K_5 jako minor právě tehdy, když G je (≤ 3) -suma kopií rovinných grafů a W_8 .*

Důsledek 6. *Pro $k \leq 4$, jestliže G neobsahuje K_{k+1} jako minor, pak $\chi(G) \leq k$.*

Nechť $f(k)$ je nejmenší přirozené číslo takové, že každý graf minimálního stupně $f(k)$ obsahuje K_k jako minor.

Důsledek 7. $f(2) = 1$, $f(3) = 2$, $f(4) = 3$, $f(5) = 6$.

4 Minory a průměrný stupeň

Lemma 8. *Pro přirozené číslo $t \geq 1$, každý graf s alespoň t^2 vrcholy buď obsahuje trojúhelník nebo nezávislou množinu velikosti alespoň t .*

Důkaz. Nechť F je graf s alespoň t^2 vrcholy, který neobsahuje trojúhelník. Má-li F maximální stupeň alespoň t , pak okolí vrcholu maximálního stupně je nezávislá množina velikosti alespoň t . Předpokládejme tedy, že F má maximální stupeň nejvýše $t - 1$.

Nechť S je největší nezávislá množina v F . Pak každý vrchol F buď patří do S , nebo má souseda v S , a proto $t|S| \geq |V(F)| \geq t^2$ a $|S| \geq t$. \square

Lemma 9. *Nechť $d \geq 1$ je přirozené číslo a nechť graf G má alespoň $d|V(G)|$ hran. Nechť G' je minor G takový, že $|E(G')| \geq d|V(G')|$ a přitom $|V(G')| + |E(G')|$ je nejmenší možné. Pak každá hrana G' je obsažena v alespoň d trojúhelnících a minimální stupeň G' je alespoň $d + 1$ a nejvýše $2d$.*

Důkaz. Nechť hrana xy grafu G' je obsažena v t trojúhelnících. Kontrakcí hrany xy snížíme počet vrcholů o 1 a počet hran o $t + 1$, a z minimality grafu G' dostáváme $t + 1 > d$, a tedy $t \geq d$. Odebrání vrcholu stupně k sníží počet vrcholů o 1 a počet hran o k , a tedy $k \geq d + 1$. Z minimality G' také plyne, že odebráním libovolné hrany se počet hran sníží pod $d|V(G')|$, a proto $|E(G')| = d|V(G')|$ a průměrný stupeň G' je $2d$. Minimální stupeň je tedy nejvýše $2d$. \square

Důsledek 10. *Nechť $d \geq 1$ je přirozené číslo a nechť graf G má alespoň $d|V(G)|$ hran. Pak existuje minor H grafu G takový, že $|V(H)| \leq 2d$ a H má minimální stupeň alespoň d .*

Důkaz. Vezměme minor G' z Lemma 9 a vyberme si v něm libovolný vrchol v minimálního stupně. Jako H označme podgraf G' indukovaný sousedy v ; pak H má nejvýše $2d$ vrcholů. Je-li $u \in V(H)$, pak jelikož hrana uv leží v alespoň d trojúhelnících v G' , dostáváme, že u má v H alespoň d sousedů. \square

Dva vrcholy grafu H jsou d -různé, mají-li méně než $d/3$ společných sousedů. Graf d -různosti grafu H má množinu vrcholů $V(H)$ a dva vrcholy jsou spojené hranou právě tehdy, když jsou d -různé.

Lemma 11. *Nechť $d \geq 1$ je přirozené číslo a nechť graf H má nejvýše $2d$ vrcholů. Má-li H minimální stupeň alespoň d , pak jeho graf d -různosti F neobsahuje trojúhelník.*

Důkaz. Uvažme libovolné různé hrany $uv, uw \in E(F)$. Nechť S je množina nesousedů vrcholu u ; máme $|S| \leq |V(H)| - \deg u \leq d$. Jelikož $uv \in E(F)$, vrchol v má méně než $d/3$ společných sousedů s u , a proto v má více než $\frac{2}{3}d$ sousedů v S . Obdobně i w má více než $\frac{2}{3}d$ sousedů v S . Počet společných sousedů v a w je tedy více než $2 \cdot \frac{2}{3}d - |S| \geq d/3$, a proto $vw \notin E(F)$. S toho plyne, že uvw není trojúhelník v F . \square

Věta 12. *Nechť $k \geq 1$ je přirozené číslo a $d = \frac{3}{2}k(k+1)$. Má-li graf G alespoň $d|V(G)|$ hran, pak G obsahuje K_k jako minor.*

Důkaz. Nechť H je minor G získaný v Důsledku 10, a tedy $|V(H)| \leq 2d$ a H má minimální stupeň alespoň d . Nechť F je graf d -různosti grafu H . Dle Lemma 11 F neobsahuje trojúhelník a dle Lemma 8 má F nezávislou množinu S velikosti k .

Uvažme libovolné dva vrcholy $u, v \in S$. Jelikož $uv \notin E(F)$, u a v mají alespoň $d/3$ společných sousedů v H , a alespoň $d/3 - k = \binom{k}{2}$ z nich není obsaženo v S . Pro každý pár $\{u, v\} \subseteq S$ si proto můžeme zvolit jejich společného souseda m_{uv} nepatřícího do S tak, že volby jsou navzájem různé pro různé dvojice vrcholů z S . Sjednocení cest $um_{uv}v$ pro $\{u, v\} \subseteq S$ tvoří podrozdělení K_k v H . Tedy H obsahuje K_k jako minor, a proto i G obsahuje K_k jako minor. \square

Důsledek 13. $f(k) \leq 3k(k+1)$