

Příklady na procvičení z Lineární algebry 1 (ZS 2020/2021): (2) Soustavy lineárních rovnic

Cv. 1. Zapište rozšířenou matici soustavy

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 6, \\ -3x_1 + x_2 &= 2, \end{aligned}$$

a vyřešte soustavu Gaussovou–Jordanovou eliminací. Znázorněte řešení soustavy graficky jako průsečík přímek (řádkový pohled) a jako součet vektorů (sloupcový pohled).



Řešení:

Rozšířená matice soustavy je

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ -3 & 1 & 2 \end{array} \right).$$

Aplikací elementárních řádkových úprav snadno nalezneme řešení $(x_1, x_2) = (1, 5)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ -3 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 4 & 20 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{array} \right).$$



Rovnice $x_1 + x_2 = 6$ a $-3x_1 + x_2 = 2$ popisují dvě přímky v rovině, řešení soustavy $(1, 5)$ je jejich průsečíkem.

Sloupce rozšířené matice soustavy můžeme zakreslit jako vektory v rovině. Řešení soustavy pak říká, že vektor $(6, 2)$ dostaneme sečtením (1-krát prodlouženého) vektoru $(1, -3)$ a 5-krát prodlouženého vektoru $(1, 1)$.

Cv. 2. Vyřešte Gaussovou nebo Gaussovou–Jordanovou eliminací následující soustavy rovnic a určete hodnotu matic:

$$(a) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right), \quad (b) \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -3 & 6 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & -1 \end{array} \right), \quad (c) \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 7 \end{array} \right).$$

Řešení:

- (a) Aplikací elementárních řádkových úprav převedeme rozšířenou matici soustavy do odstupňovaného tvaru:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & | & 2 \\ 4 & 1 & 2 & | & 2 \\ 1 & -1 & 3 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 3 \\ 2 & -3 & 4 & | & 2 \\ 4 & 1 & 2 & | & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 3 \\ 0 & -1 & -2 & | & -4 \\ 0 & 5 & -10 & | & -10 \end{pmatrix} \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 3 \\ 0 & -1 & -2 & | & -4 \\ 0 & 0 & -20 & | & -30 \end{pmatrix}.$$

Zpětnou substitucí získáme jediné řešení soustavy $(x_1, x_2, x_3) = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$.

Alternativně můžeme také použít Gaussovu–Jordanovu eliminaci a převést matici do redukovaného odstupňovaného tvaru

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Hodnost matice je daná počtem nenulových řádků (počtem pivotů) odstupňovaného tvaru. V tomto případě platí $\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b) = 3$.

- (b) Opět upravíme matici pomocí elementárních řádkových úprav:

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 & 6 & | & 2 \\ 1 & -2 & 1 & | & 3 \\ 2 & 3 & 3 & | & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 3 \\ 5 & -3 & 6 & | & 2 \\ 2 & 3 & 3 & | & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 7 & 1 & | & -13 \\ 0 & 7 & 1 & | & -7 \end{pmatrix} \sim \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 3 \\ 0 & 7 & 1 & | & -13 \\ 0 & 0 & 0 & | & 5 \end{pmatrix}$$

Poslední řádek upravené matice reprezentuje rovnici $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 5$, soustava tedy nemá řešení.

Vidíme, že se v posledním sloupci upravené matice nachází pivot a hodnost rozšířené matice soustavy je $\text{rank}(A | b) = 3$, zatímco $\text{rank}(A) = 2$.

- (c) Aplikací elementárních úprav převedeme matici na tvar:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 3 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & | & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 3 \\ 0 & 2 & 4 & -1 & | & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

Nyní můžeme použít zpětnou substituci, nebo dále upravit matici až na redukovaný odstupňovaný tvar

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{pmatrix}.$$

Z posledního řádku upravené matice dostaneme $x_4 = 0$. Z druhého řádku můžeme vyjádřit $x_2 = 3 - 2x_3$, přičemž volnou proměnnou x_3 ponecháme jako parametr. Nakonec z prvního řádku dostaneme $x_1 = 1 + x_3$. Soustava má tedy nekonečně mnoho řešení ve tvaru

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1 + x_3, 3 - 2x_3, x_3, 0) = (1, 3, 0, 0) + x_3 \cdot (1, -2, 1, 0).$$

V tomto případě opět platí $\text{rank}(A) = \text{rank}(A | b) = 3$, ale zároveň je $\text{rank}(A)$ menší než počet proměnných.

Cv. 3. Vyřešte soustavu lineárních rovnic s různými pravými stranami:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ 1 & -5 & 4 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} -9 \\ 13 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -15 \end{pmatrix}.$$


Řešení:

Jelikož lze pro všechny tři soustavy použít Gaussovu eliminaci se stejnou sérií elementárních řádkových úprav, můžeme uvažovat všechny tři pravé strany najednou a aplikovat eliminaci na matici

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ -3 & 1 & 2 & -3 & 3 & -15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ -3 & 1 & 2 & -3 & 3 & -15 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 0 & -14 & 14 & 0 & 42 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & -7 & -7 & -21 & 7 \end{array} \right) \sim \\ & \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -5 & 4 & 1 & 13 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 & -9 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Řešením soustavy je tedy vektor $x = (2, 1, 1)$ pro pravou stranu b_1 , vektor $x = (1, 0, 3)$ pro b_2 a vektor $x = (4, -1, -1)$ pro b_3 .

Cv. 4. Uvažujme neobývaný dům se čtyřmi místnostmi dle obrázku:



Z jihu je dům ohříván průměrnou teplotou 25 °C, z východu 10 °C, ze západu 20 °C a ze severu 5 °C. Určete teplotu x_1, \dots, x_4 v jednotlivých místnostech pokud známe (zjednodušenou) fyzikální poučku, že teplota dané oblasti je průměrem teplot okolních oblastí.

Řešení:

Je třeba si sestavit správnou soustavu rovnic. Pro každou místnost sestavíme rovnici, která bude popisovat teplotu v dané místnosti. Pro první místnost tedy máme rovnici:

$$x_1 = \frac{1}{4}(20 + 5 + x_2 + x_3).$$

Po přeuspořádání a vynásobení 4 dostaneme: $4x_1 - x_2 - x_3 = 25$. Pokud takto získáme rovnici pro všechny 4 místnosti dostaneme následující soustavu.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & -1 & -1 & 0 & 25 \\ -1 & 4 & 0 & -1 & 15 \\ -1 & 0 & 4 & -1 & 45 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & 35 \end{array} \right)$$

Po vyřešení soustavy dostaneme: $x_1 = 13.75, x_2 = 11.25, x_3 = 18.75, x_4 = 16.25$.

Cv. 5. Vyřešte soustavu lineárních rovnic s parametrem $a \in \mathbb{R}$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 1 \end{array} \right).$$

Řešení:

Pomocí Gaussovy eliminace převedeme matici na odstupňovaný tvar:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cccc|c} a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & 2-a-a^2 & 1-a \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3-2a-a^2 & 1-a \end{array} \right) \end{aligned}$$

Z posledního řádku upravené matice dostaneme rovnici $(a+3)(1-a)x_4 = 1-a$, tedy $x_4 = \frac{1}{a+3}$ pro $a \notin \{-3, 1\}$. Zpětnou substitucí pak dopočítáme řešení

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{1}{a+3}, \frac{1}{a+3}, \frac{1}{a+3}, \frac{1}{a+3} \right).$$

Pro $a = -3$ dostaneme rovnici $0x_4 = 4$, soustava tudíž nemá řešení.

Pro $a = 1$ má soustava nekonečně mnoho řešení popsaných rovnicí $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$, tedy ve tvaru $(1 - x_2 - x_3 - x_4, x_2, x_3, x_4)$ pro $x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$.

Cv. 6. Najděte soustavu 3 lineárních rovnic o 4 proměnných s řešením

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 0) + x_2 \cdot (-2, 1, 0, 0) + x_4 \cdot (-3, 0, 2, 1), \text{ kde } x_2, x_4 \in \mathbb{R}.$$

Řešení:

Hledáme soustavu lineárních rovnic s řešením

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3, x_4) &= (1, 0, 1, 0) + x_2 \cdot (-2, 1, 0, 0) + x_4 \cdot (-3, 0, 2, 1) \\ &= (1 - 2x_2 - 3x_4, x_2, 1 + 2x_4, x_4). \end{aligned}$$

Můžeme tedy vytvořit soustavu obsahující rovnice $x_1 = 1 - 2x_2 - 3x_4$ a $x_3 = 1 + 2x_4$ a třetí rovnici, která množinu řešení dál neomezí, např.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 2 \end{array} \right), \quad \dots$$