

12. cvičení z PSt — 22.5.2025

Testování hypotéz

1. (Všimněte si podobnosti a rozdílu oproti příkladům na intervalový odhad.) Máme jedno měření $X \sim N(\mu, 1)$. Chceme ověřit hypotézu $H_0: \mu = 5$ s hladinou významnosti $\alpha = 5\%$.

(a) Jaký zvolíme kritický obor – množinu měření, ve které hypotézu zamítneme? (Co řekneme, pokud jsme naměřili $x = 6$?)

(b) Místo jednoho měření jich provedeme n (pochopitelně nezávislých). Jaký bude kritický obor pro $\bar{X}_n$? (Co řekneme, pokud jsme naměřili 6.5, 6, 5, 4.8, 5.5?)

(c) Pokud je ve skutečnosti $\mu = 4$ a máme $n = 10$ měření, jaká je pravděpodobnost, že hypotézu nezamítneme?

(d) Necht' X má stále střední hodnotu μ a rozptyl 1, ale není už nutně normální. Co se změní?

(e) Co když nevíme nic o rozptylu X ?

2. Co když vybíráme vzorky ze dvou populací? (Obě s normálním rozdělením.) (a) Co můžeme testovat?

(b) Vytvořte vhodný model.

(c) Zkuste vymyslet dvě různé situace, ke kterým je třeba přistupovat různě. (Nápověda: v jedné situaci je nutné, aby měly obě populace stejnou velikost.)

3. Podle slibu výrobce bude jeho stroj dělat chyby nejvýše ve 3 % případů. Z 600 pokusů došlo k chybě v 28 případech. Posuďte slib výrobce (coby nulovou hypotézu) na hladině významnosti 5 %.

(a) Počet chyb modelujte přesně, tj. pomocí binomického rozdělení.

(b) Počet chyb modelujte přibližně pomocí normálního rozdělení (s vhodným μ , σ^2).

Test dobré shody

4. Přednášející vypsal několik zkušebních termínů a předpokládal, že se na všechny přihlásí zhruba stejně studentů. Otestujte tuto hypotézu pomocí testu dobré shody. Napřed formulujte co je nulová hypotéza. Zkuste potrénovat intuici tím, že odhadnete bez testu, jak vám data připadají. Pak spočítejte χ^2 statistiku v ruce, nebo na počítači (na počítači můžete použít i G -test, pro srovnání). V pythonu budete používat funkce `stats.chisquare(obs)`, `event. stats.power_divergence(obs, lambda_ = 'log-likelihood')`.

Naměřené hodnoty:

(a) 42, 59, 42, 33, 21

(b) 25, 40, 41, 27

5. Pojďme zkontrolovat, zda počty emailů jsou opravdu dobře modelovány Poissonovským rozdělením. Můžete použít svoje data, nebo použít moje, za loňský listopad. (Nejsou to všechny emaily, jenom „ty důležité“ podle klasifikace Gmailu, ale to by na statistických vlastnostech nemělo nic měnit.)

`moje_emaily11 = c(0, 6, 14, 8, 8, 9, 3, 3, 12, 12, 15, 7, 15, 2, 5, 13, 5, 17, 15, 11, 9, 2, 16, 8, 9, 11, 6, 2, 2, 9)`

Rozmyslete, jak použít test dobré shody, zjistěte velikost λ a test proveďte. V R můžete použít buď vzorec z přednášky a dosadit do distribuční funkce (`pchisq(T, df)`), nebo použít příkaz `chisq.test`. Ideálně zkuste obojí.

Pro případné zvýšení přesnosti lze použít příkaz `options(digits = 22)`.

Zamyslete se nad výsledkem.

K procvičení

6. Otestujte náhodnost kostky. Můžete házet ručně, máte-li kostku po ruce, nebo využít vhodný generátor (na webu, např. <https://www.random.org/dice/?num=60> – výsledek jde kopírovat a vložit jako posloupnost čísel – nebo softwarový). Případně přímo v R (např. `sample(6,100, replace=T)`). Použijte Pearsonův χ^2 test dobré shody.

7. Bezpečnostní kamera pozoruje hlídanou oblast a naměří signál $X = W$, pokud není přítomen lupič (hypotéza H_0) nebo $X = W + \theta$, pokud lupič přítomen je (hypotéza H_1). Víme, že $\theta > 0$, ale přesnou hodnotu neznáme (závisí na velikosti lupiče).

Předpokládáme, že $W \sim N(0, 0.5)$.

- (a) Naměříme jednu hodnotu $X = 0.96$. Máme nulovou hypotézu zamítnout na hladině 5 %?
- (b) Naměříme pět nezávislých hodnot 0.96, -0.34, 0.85, 0.51, -0.24. Máme nulovou hypotézu zamítnout na hladině 5 %?
- (c) Opakujte část (b) pomocí t -distribuce (bez předpokladu znalosti rozptylu).

8. Nechť $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ popisuje dráhu, kterou uletí radioaktivní částice, nechť se rozpadne. Náš přístroj její rozpad (a polohu rozpadu, tj. hodnotu X) zachytí, ale jen pokud $1 \leq X \leq 2$. Formálně, budeme zkoumat náhodný výběr $X_1, \dots, X_n \sim F_{X|B}$ pro jev $B = 1 \leq X \leq 2$.

- (a) Navrhněte bodový odhad λ momentovou metodou.
 - (b) Navrhněte bodový odhad λ metodou maximální věrohodnosti.
 - (c) Pro každý z nich zjistěte, zda je nestranný a konzistentní.
9. Máme náhodný výběr $X_1, \dots, X_n \sim \text{Pois}(\lambda)$.
- (a) Navrhněte bodový odhad λ momentovou metodou.
 - (b) Navrhněte bodový odhad λ metodou maximální věrohodnosti.
 - (c) Spočítejte střední kvadratickou odchylku (MSE).

p	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
$\Psi_1^{-1}(p)$	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66
$\Psi_2^{-1}(p)$	1.89	2.92	4.3	6.96	9.92
$\Psi_4^{-1}(p)$	1.53	2.13	2.78	3.75	4.6
$\Psi_8^{-1}(p)$	1.4	1.86	2.31	2.9	3.36
$\Psi_{20}^{-1}(p)$	1.33	1.72	2.09	2.53	2.85
$\Psi_{30}^{-1}(p)$	1.31	1.7	2.04	2.46	2.75
$\Phi^{-1}(p)$	1.28	1.64	1.96	2.33	2.58